


ما هو العلاج الضوئي وملاداً يحتاجه طفلي؟

يحتاج طفلك إلى العلاج الضوئي أو "العلاج بالضوء" لعلاج اليرقان (الصفرة) الناجم عن إرتفاع مستويات البيليروبين عنده. يساعد العلاج الضوئي على خفض مستويات البيليروبين، ومنع اليرقان (الصفرة) من التزايد. المصطلح الطبي لليرقان هو إرتفاع البيليروبين في الدم. قد تؤدي المستويات المرتفعة من البيليروبين في دم طفلك إلى ما يسمى فرط بيليروبين الدم الحاد. الخبر السار هو أن إكتشاف فرط بيليروبين الدم الحاد وعلاجه يتم في وقت مبكر عندما يتلقى الأطفال رعاية منتظمة من قابلاتهم. معظم الأطفال الذين يعانون من مستويات مرتفعة من البيليروبين لا يعانون من أية مضاعفات ناتجة عن العلاج الضوئي، وبكلورون ليصبحوا أطفالاً وبالغون أصحاب.

احتمالات الإصابة عند طفلك



كيف يعمل العلاج الضوئي؟


يسقط العلاج الضوئي ضوءاً أزرق أو أبيض قوي على جسم طفلك. يمتص جلد طفلك هذا الضوء مما يساعد في تحطيم البيليروبين إلى جزيئات يمكنه التخلص منها بسهولة من خلال التبول والبراز. هناك طريقتان للعلاج الضوئي لطفلك، إما من خلال صندوق إضاءة أو بتغطيته ببطانية بيلي.



صندوق إضاءة

- يتم وضع صندوق إضاءة فوق السرير لتسلیط الضوء على جسم طفلك بالكامل.

- يجب تغطية عينيك طفلك لحمايتها من الضوء.



بطانية بيلي

- يلف طفلك بطانية مصنوعة من ألياف خفيفة خاصة تشغ على جلد طفلك.

- من السهل حمل وإرضاع طفلك أثناء العلاج الضوئي.

- عندما يكون اليرقان أقل حدة، تستخدم البطانية الليفية المشعة بمفردها.

تقدم هذه الوثيقة معلومات سهلة وبسيطة تستند إلى دليل الممارسة السريرية لجمعية أونتاريو رقم 18: الساقطة على إرتفاع البيليروبين (الصفراء) في الدم عند الأطفال الخدج وحديثي الولادة الأصحاء. هذا الدليل مصمم لمساعدتك على فهم أفضل البعض الاعتبارات والخيارات التي قد تواجهك أثناء تلقيك الرعاية الصحية من القابلة الخاصة بك، وليس المقصود منه استبدال المناقشات المنجزة التي ستجري بينك وبين القابلة. إذا ما تولدت لديك أية أستلة أو مخاوف أو ملاحظات بعد قراءة هذه الوثيقة يرجى مناقشتها مع القابلة.

أين سيتلقى طفلي العلاج الضوئي؟

من المرحوم أن يتلقى طفلك العلاج الضوئي في المستشفى، حيث يتم العلاج الضوئي إما من خلال صندوق الإضاءة ، أو مزيج من صندوق الإضاءة وبطانية بيبي. من المحتمل أن تتم مراقبة طفلك بواسطة الممرضات ، لكن الشخص المسؤول عن رعايته سيكون إما القابل أو الطبيب.

في بعض المجتمعات ، تمتلك القابلات الأدوات الازمة لتقديم العلاج الضوئي في المنزل باستخدام البطانية الليفية المشعة ، ولكن هذا الخيار ليس متاحاً لمعظم المرضى في المقاطعة في الوقت الحالي.

هل هناك آثار جانبية للعلاج الضوئي؟

العلاج الضوئي غير ضار لم معظم الأطفال. قد يعاني بعض الأطفال من بعض الآثار الجانبية البسيطة بما في ذلك:

- الجفاف - إذا لم يحصلوا على ما يكفي من الحليب
- الطفح الجلدي
- الاحساس بالحرارة
- براز مائي، مفكك
- تغيرات في لون الجلد (متلازمة الرضيع البروتينية)



ما هي المدة التي يستغرقها العلاج الضوئي لطفل؟

يحتاج الأطفال عادة للعلاج الضوئي لمدة 24 ساعة تقريباً.
سيتم إيقاف العلاج بمجرد أن يصل مستوى البييليروبين لدى طفلك إلى مستوى آمن.

كيف لي أن أعرف ما إذا كان العلاج الضوئي فعال؟

ستتم مراقبة طفلك عن كثب من قبل مقدم الرعاية الصحية (قابلة أو ممرضة أو طبيب) للتأكد من أن:

- فعالية العلاج الضوئي وأن مستوى البييليروبين (الصفراء) عند طفلك آخذ في الانخفاض
- مستوى البييليروبين (الصفراء) عند طفلك قد وصل إلى مستوى آمن
- طفلك بصحة جيدة

بعض الأمور التي سيقوم بها موفروا الرعاية أثناء العلاج الضوئي لطفلك وتشمل:

- التتحقق من ان درجة الحرارة والتنفس ومعدل ضربات القلب منتظمة
- المساعدة في التأكد من ان الطفل يتغذى بشكل جيد
- أخذ فحوصات الدم للتأكد من أن مستوى البييليروبين قد انخفض ووصل إلى مستوى آمن

كيف يمكنني الاستعداد للعلاج الضوئي لطفلي؟

يجب أن تكوني مستعدة للبقاء في المستشفى طوال الليل. قد تساعد قائمة الحزم المدرجة أدناه في جعل إقامتك في المستشفى أكثر راحة.

| لوازم أخرى قد تجدها مفيدة: | لطفلك: | لنك: |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> الطعام والوجبات خفيفة (أسأي قابلتك إن كنت ستحصلين على ثلاثة تخزين طعامك) | <input type="checkbox"/> ملابس حديثي الولادة (ما في ذلك قبعة الطفل) | <input type="checkbox"/> ملابس مريحة |
| <input type="checkbox"/> مضخة الثدي | <input type="checkbox"/> حفاضات الأطفال حديثي الولادة | <input type="checkbox"/> الجوارب والنعال |
| <input type="checkbox"/> شاحن الهاتف والهاتف | <input type="checkbox"/> مقعد سيارة للرضع | <input type="checkbox"/> مستلزمات التواليت |
| <input type="checkbox"/> وسائل اضافية | | <input type="checkbox"/> فوط صحية للإقامة الليلية |
| <input type="checkbox"/> وسادة الرضاعة | | <input type="checkbox"/> فوط للرضاعة |
| <input type="checkbox"/> مواد القراءة | | <input type="checkbox"/> البطاقة الصحية / بطاقة هوية |
| <input type="checkbox"/> زجاجة ماء | | <input type="checkbox"/> عبوات ثلوجية للتمزقات المهبليّة (إذا لزم الأمر) |
| <input type="checkbox"/> مناديل ورقية | | <input type="checkbox"/> أيبوبروفين أو أستيتامينوفين (أدوية للأوجاع) |
| <input type="checkbox"/> المال لشراء الطعام وغيرها | | <input type="checkbox"/> أدوية طبية أخرى قد تحتاجينها |

هل يامكاني الاستثمار بارضاع طفلي أثناء العلاج بالضوء؟

يجب أن تحاول الإستثمار بارضاع طفلك أثناء العلاج الضوئي.
الرضاعة تساعد على:



- توفير السوائل التي يحتاجها طفلك
- توفير التغذية التي يحتاجها طفلك
- ازالة البيليروبين (الصفراء) من جسم طفلك
- احساس طفلك بأنه بالقرب منك

إذا لم ينخفض مستوى البيليروبين لدى طفلك بسرعة كافية ، فقد يُطلب منك التوقف عن الرضاعة حتى يتمكن طفلك من قضاء المزيد من الوقت تحت الأضواء. خلال هذا الوقت ، ستحتاجين إلى الإستثمار في إدرار الحليب باستخدام مضخة و / أو اليد لإدرار الحليب. يمكنك إرضاع هذا الحليب لطفلك بواسطة كوب أو زجاجة أثناء وجوده تحت الأضواء.

حليب الإنسان هو أفضل غذاء لحديثي الولادة.
ومع ذلك ، إذا كان طفلك:

- لا يشرب كمية كافية للبقاء مشبع بالماء
- أو يفقد الكثير من وزنه

فقد يوصى بإضافة حليب صناعي إلى غذائه.

من المهم أن تستمري في إعطاء طفلك حليب مع الحليب الصناعي. هذا يساعد:

- طفلك في الحصول على العناصر الغذائية المهمة والغلوبيولين المناعي من حليبك وهي عناصر غير موجودة في الحليب
- يساعدك على إستمرار إدرار حليبك عندما يعود طفلك إلى الرضاعة منك مرة أخرى

تحديثي إلى قابلتك حول كيفية إرضاع طفلك بنجاح أثناء تلقيه للعلاج الضوئي.

ماذا لو عاد اليرقان (الصفرة) لطفل؟

بعد الانتهاء من العلاج الضوئي والذهاب إلى المنزل يرتفع مستوى البيليروبين (الصفراء) عند بعض الأطفال مرة أخرى. إذا حدث هذا لطفلك، فعلى الأرجح أنك ستتحاجين إلى العودة لمزيد من العلاج الضوئي. إنصلي بالقابلة إذا لاحظت العلامات التالية بعد تلقي طفلك العلاج الضوئي:

ماذا لو لم يستجيب طفلي للعلاج الضوئي؟

إذا لم يتحسن طفلك بعد تلقيه العلاج الضوئي ، فقد يوصي الطبيب بعلاجات أخرى ، مثل الدواء الوريدي (IV) أو نقل الدم. مما يعني إدخال طفلك إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفى (NICU).



- طفلك شديد النعاس طوال الوقت ويصعب إيقاظه
- يجب أن لا ينام طفلك لمدة تزيد عن أربع إلى ست ساعات خلال فترة 24 ساعة دون أن يستيقظ للرضاة.
- بياض عينا طفلك يبدو مصفرًا
- تبدأ بشرة طفلك بالاصفرار
- يرفض طفلك الرضاة
- يجب أن يأكل طفلك مرة كل ساعتين إلى أربع ساعات ، من 8 إلى 12 مرة يومياً ولمدة 20 دقيقة أو أكثر في كل مرة.

في وقت ما بعد الانتهاء من العلاج الضوئي سيتم فحص مستوى البيليروبين (الصفراء) عند طفلك ، عادة بعد حوالي 24 ساعة. يمكن إجراء هذا الاختبار في المنزل أو في العيادة الخارجية أو في المستشفى.

أمور يجب على الوالدين أخذها بعين الاعتبار

أثناء وجودك في المستشفى مع طفلك ما زلت في فترة التعافي من الولادة. فحتى لو كان طفلك بحاجة إلى رعاية الطبيب، يجب أن تستمري في تلقي الرعاية التي تحتاجينها للشفاء. يمكن للقابلة أن تساعدك في الحصول على أكبر قدر من الراحة أثناء وجودك في المستشفى.

تذكري:

- بشكل عام، العلاج الضوئي غير ضار
- تقريباً، جميع الأطفال الذين يتلقون العلاج بالضوء يتعافون من اليرقان

ومع ذلك، من الطبيعي أن:

- تشعري بالارتباك حيال تشخيص طفلك و حاجته للعلاج الضوئي
- تشعري بالقلق حول كيفية تأثير اليرقان (الصفرة) والعلاج الضوئي على صحة طفلك
- تجدين صعوبة نتيجة عدم قدرتك على حمل طفلك لفترات زمنية
- تشعري بالإرهاق تجاه رعاية طفلك الجديد أثناء العلاج الضوئي بينما لا تزالين في طور التعافي من الولادة

بعض الأمور التي قد تساعدك أثناء تجربة خضوع طفلك للعلاج الضوئي تشمل:

- اسألِي القابلة أو مقدمي الرعاية الصحية الآخرين عن معلومات حول اليرقان (الصفرة) والعلاج الضوئي وما يمكنك توقعه.
- تحدثي إلى القابلة أو غيرها من مقدمي الرعاية الصحية عن أية مخاوف لديك تخص طفلك.
- تأكدي من العناية بصحتك وراحتك عن طريق:

- التحدث إلى قابلتك حول مخاوفك بخصوص تعافيكم
- تناول الطعام بشكل جيد ، وبقاءك ممتنعة، والحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة
- اطلبِي المساعدة من الأشخاص الداعمين لك (مثل تقديم الطعام وبعض احتياجاتك ورعايَة أطفالك الآخرين ، وما إلى ذلك).



اسئلة

إن كانت لديك أي مخاوف أو أسئلة بعد قراءة هذا الكتيب ، فتحثثي إلى القابلة. كتابة أسئلتك أو أفكارك هنا للرجوع إليها في موعدك التالي قد يكون مفيدا :

